



OPERATION I FULD BEDØVELSE

Før operation

Det er et krav at begge forældre samtykker til operationen. Bør forældrene ikke sammen skal skriftligt samtykke medbringes fra den forældre der evt. ikke deltager.

Forud for operationen og operationstidspunkt

Vi anbefaler to voksne kommer med på operationsdagen.

Vi sender en SMS dagen før planlagt operationsdag mellem kl.: 12- 13.30.

Hvis I ikke modtager en SMS, så læg en besked på klinikkens tlf. svarer senest kl. 14 på 5665 4344

Såfremt barnet er sygt og/eller har feber dagen før eller på operationsdagen, bedes I kontakte klinikken og lægge besked på tlf. svarer på 5665 4344

Hvis sygdommen skyldes forkølelse eller mellemørebetændelse kan barnet som regel opereres alligevel.

Fasteregler på operationsdagen

6 timer for fast føde, mælk & juice, tyggegummi, slik, tandbørstning

4 timer for modermælkserstatning

3 timer for ammemælk

2 timer for vand eller klar saftvand

Det betyder at barnet hverken må spise, drikke, få slik, tyggegummi eller børste tænder i de timer. Barnet må dog godt få et lille glas vand eller klar saftvand senest 2 timer før mødetidspunktet.

Smertestillende

Vi anbefaler der gives smertestillende hjemme 2 timer inden mødetid.

Ved fjernelse af polypper/eftersyn af polypper og skrumpning af mandler anbefales dobbeltdosis Pamol/Panodil/paracetamol som mixtur eller stikpille 2 timer før.

Ved dræn alene anbefaler vi én almindelig Pamol/Panodil/paracetamol dosis 2 timer før.

Vær opmærksom på

- God ide at få tisset af inden operation eller bleskift inden operation
- I skal selv medbringe tæppe eller lille dyne
- Få vejet barnet inden dagen for operationen.
- Se gerne filmen om Finn der skal bedøves med dit barn inden operationsdagen - [klik her](#)



På operationsstuen

På operationsstuen og fuld bedøvelse (narkose)

Narkoselægen har meget stor rutine. Barnet bedøves med en narkosegas, der hedder Sevorane. Virkningen indtræder meget hurtigt, dvs. i løbet af 1/2-1 minut. Under bedøvelsen gives desuden ilt og i nogen tilfælde lattergas. Når operationen er slut, afbrydes anæstesigassen og barnet vil vågne i løbet af få minutter. Der er kun meget sjældent bivirkninger af Sevorane. Der er for eksempel sjældent at selve narkosen er skyld i kvalme og opkastninger under opvågningen.

Når I kommer ind på operationsstuen, skal barnet op og ligge på lejet. Nogle børn bliver kortvarig utrygge, hvorfor vi anbefaler I forud har set filmen om Finn der skal bedøves ([klik her](#)) og at forældrene/værge har besluttet sig hjemmefra om I ønsker operationen.

Vores narkoselæge giver narkosemiddel på maske over barnets mund og næse. I starten af narkosen vil barnet få ufrivillige muskeltrækninger ca. 1 minut. Det er normalt og kan hverken mærkes eller huskes af barnet.

I/du bliver vist ud i venteværelset så snart barnet sover og mens operationen udføres. Når barnet skal til at vågne op, kommer I/du ind i opvågningsrummet.



Efter operation

Under opvågningen kan der komme en kort periode med uro og gråd. Barnet er stadig under påvirkning af narkosen og husker intet bagefter. Sjældent kan barnet blive overraskende aktivt. Det kan vare op til et par timer.

Observation på dagen efter operationen

Efter operationen kan barnet være mere træt og sove tungere end normalt og kan evt. være forkvalmet/kaste op. **I skal derfor observere jeres barn 6 timer efter operationen og må ikke sove alene de første 6 timer efter narkose.**

Resten af dagen bør barnet holdes i ro.

Efter fjernelse af polypper og mindskning af mandlerne kan der komme lidt blodtegning i spyttet. Det er normalt. Giv gerne is. Skulle der komme blødning fra næse eller mund ringes 112 og barnet skal til nærmeste øre-næse-halsafdeling. Efterblødning er uhyre sjældent, men søg læge hvis du er i tvivl. Det er i øvrigt vigtigt, at barnet indtager rigelige mængder kolde drikke (uden brus) og herefter kølig kost, f.eks. yoghurt og vaniljeis.

Hjemtransporten

Bør ikke foretages med bus eller tog, men evt. i taxa eller privat bil. Såfremt man selv er kørende, bør der være yderligere en voksen til at tage sig af barnet.

Hvor længe skal barnet være hjemme

Dræn: Barnet kan genoptage sædvanlige aktiviteter dagen efter operationen.

Polypper: Barnet bør holdes hjemme fra institution/dagpleje/skole to dage efter operationen. I øvrigt efter aftale.

Mandler: Barnet bør holdes hjemme én uge efter operationen.

Efterforløb

Dræn: kontrolleres efter aftale, sædvanligvis én måned efter operationen og derefter hver 6. måned indtil drænene er faldet ud

- Ingen svømmehal de første 14 dage efter drænanlæggelse.
- Efter de 14 dage anbefales det at have svømme-propper i ørene. Barnet må ikke dykke under 0,5 meter, grundet at trykket stiger i ørene.
- Dræn-ører må gerne flyde, men ikke mere end 3 dage. Start altid med at skylle med eddikevand (vejledning til eddikevand: www.charlotte-lynggaard.dk) når det flyder, hvis det stadigvæk flyder efter 3 dage, så skal forældrene ringe og få en recept på øredråber.
- Ved fjernelse af polypper og skrumpning af mandler, kan der med fordel gives Panodil efter vægt i et par dage. Dosis kan regnes ud på: <https://www.panodil.dk/dosage-results/>